



พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์
ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด (2536)

Behaviors of mothers of down syndrome
during and after pregnancy

เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์

สุจิตรา ศรีสุโร

จินตนา ม้าเร็ว

พูลสุข สรียาภรณ์

0.
2พ
36



พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์
วจ.ราชานุกูล 01, ๖8/5พ 2536



RERAJA01
RAJANUKUL LIBRARY

พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์, พ.บ.*

สุจิตรา ศรีสุโร, วท.บ. (พยาบาล)*

จินตนา ม้าเร็ว, วท.บ. (พยาบาล)*

พลสุข สรียาภรณ์, วท.ม. (พยาบาล)**

เรื่องย่อ : ศึกษามารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์อายุ ๓-๕ ปี รับการส่งเสริมพัฒนาการที่โรงพยาบาลราชานุกูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๓๕, จำนวน ๗๕ ราย แบ่งเป็นมารดาอายุน้อยกว่า ๓๕ ปี จำนวน ๔๒ ราย (ร้อยละ ๕๖) และมารดาอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไปจำนวน ๓๓ ราย (ร้อยละ ๔๔). มารดาทั้ง ๒ กลุ่มมีอัตราการแท้งบุตรสูงกว่ามารดาทั่วไปถึง ๔ เท่า, ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๐.๗) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์มาก่อน. หลังจากมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์มารดาอายุน้อยกว่า ๓๕ ปี ตัดสินใจทำหมันร้อยละ ๔.๘ และกำลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรอีกร้อยละ ๔๗.๖ แตกต่างจากมารดาที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ซึ่งตัดสินใจทำหมันร้อยละ ๓๕.๔ และกำลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรอีกเพียงร้อยละ ๖.๑ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับค่าพีเท่ากับ ๐.๐๐๐๖ และ ๐.๐๐๐๒ ตามลำดับ. สำหรับมารดาที่มีบุตรอีกได้รับการตรวจเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำคร่ำร้อยละ ๗๗.๓, นอกจากนี้มารดา ร้อยละ ๗๘.๗ ได้รับทราบว่าเป็นกลุ่มอาการดาวน์จากแพทย์ผู้ดูแลมารดาหรือเด็กหลังคลอด และร้อยละ ๖๒.๘ ได้รับคำแนะนำจากแพทย์กลุ่มนี้ให้นำบุตรรับการส่งเสริมพัฒนาการ.

Abstract : Behaviors of Mothers of Down Syndrome During and After Pregnancy

Kanokpongsakdi R, M.D.,* Srisuro S, B.Sc.,* Mareow C, B.Sc.,* Sriyaporn P, M.S.N.**

*Rajanukul Hospital, **Department of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

Siriraj Hosp Gaz 1993; 45: 327-335.

Seventy five mothers of Down syndrome children aged 3-5 years old who attended the Early Developmental Intervention Program at Rajanukul Hospital during the months of May 1990 and April 1992 were interviewed. Of the 75 mothers, 42 were young mothers (aged under 35 years) and 33 were elderly mothers (aged 35 years and over). Both groups have had four times higher histories of having abortion than statistical reports of the general mothers. Most mothers (90.7%) reported that they had never known about Down syndrome before the birth of their Down syndrome children. After having Down syndrome children, there was a statistically significant difference in behaviour toward sterilization between the young and the elderly mothers ($p=0.0006$).

*โรงพยาบาลราชานุกูล,**ภาควิชาพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล.

รับต้นฉบับ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕

ปรับปรุงและรับตีพิมพ์ พฤษภาคม ๒๕๓๖